

- 4) 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 大腿骨頸部／転子部骨折ガイドライン策定委員会: 第6章・セメント使用とセメント非使用の選択基準は. 大腿骨頸部／転子部骨折診療ガイドライン (松下 隆ほか), 南江堂, 東京 2005; 101-102.
- 5) 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 大腿骨頸部／転子部骨折ガイドライン策定委員会: 第7章・術前牽引は必要か. 大腿骨頸部／転子部骨折診療ガイドライン(松下 隆ほか), 南江堂, 東京 2005; 122-123.
- 6) 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 大腿骨頸部／転子部骨折ガイドライン策定委員会: 第7章・術後早期荷重は可能か (早期荷重が可能な条件は). 大腿骨頸部／転子部骨折診療ガイドライン (松下 隆ほか), 南江堂, 東京 2005; 136-137.
- 7) Parker MJ, et al. : Pre-operative traction for fractures of the proximal femur. Cochrane Database Syst Rev 2000 ; (2) : CD000168.
- 8) Parker MJ, et al. : Pre-operative traction for fractures of the proximal femur. Cochrane Database Syst Rev 2001 ; (1) : CD000168.
- 9) Parker MJ, et al. : Pre-operative traction for fractures of the proximal femur. Cochrane Database Syst Rev 2001 ; (3) : CD000168.

ほっと ぷらぎ

変性腰部脊柱管狭窄症は SLR (-)

変性腰部脊柱管狭窄症の診断は問診でほとんどつく。これを裏付ける臨床所見中, SLR は椎間板ヘルニアとの鑑別で重要である。すなわち SLR (-) の多くは変性腰部脊柱管狭窄症である。ただ, ASO による足の色調, 冷感, 足背動脈のチェックもお忘れなく。

医療法人社団元氣会 札幌整形外科 小 熊 忠 教