ま と め

1．鎖骨骨折により胸郭出口症候群を起こした症例を経験した．

2．中１/３の骨折で，短縮が20㎜をこえた鎖骨骨折については，胸郭出口症候群の発症を念頭に置き治療を進める必要がある．

文　　献

1）Hill JM, et al. : Closed treatment of displaced middle-third fracture of the clavicle gives poor result. J Bone Joint Surg 1997；79ーB：537－539.

2）Kitsis CK, et al. : Late complications following clavicular fractures and their operative management. Injury, Int. J Care Injured 2003；34：69－74.

ほっと ぷらざ

高度救命救急センターでの日々

札幌医大高度救命救急センター勤務となってはや１年半がすぎましたが，そもそも高度救命救急センターの「高度」ってなに？って思い聞いてみたところ，重傷熱傷，重傷頭部外傷，切断指肢に24時間対応可能な施設につくそうです（間違ってたらすみません）．皆さんもご存知の通り，前任者（土田先生）が偉大だと後任は何かと背伸びしなければならず，なかなか大変です．医療水準を下げるわけにはいかないですからね．さて，外傷患者さんですが，皆さんもお気づきだとは思いますが，なぜに同じような患者さんが立て続けにくるのでしょうか．不思議です．当センターでも切断指３連発とか，多発外傷３連発，骨盤外傷４連発，，，なんて感じで，３例セットの事が多いです．集中的にくるのはいい面もありますが，当然大変でもあります．今のところはほぼ術者が一人状態で大変ですが，めげずにがんばってもっと外傷に興味のある人を増やし，もっともっと外傷医療を発展させていきたいと考えておりますので，皆様のご協力よろしくお願いいたします．

札幌医科大学　高度救命救急センター　入　船　秀　仁